

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO PER L'ESECUZIONE DEL TAMPONE ANTIGENICO PER LA RICERCA DI SARS-CoV2

Io sottoscritto/a
nato/a a il

Oppure (per utenti minorenni)

Io sottoscritto
nato a il ____/____/_____

Documento d'identità _____

In qualità di Esercente la potestà genitoriale Tutore Amministratore di sostegno
 Legale Rappresentante

Dichiaro di aver letto e compreso tutte le informazioni contenute nel documento "INFORMATIVA PER L'ESECUZIONE DEL TAMPONE ANTIGENICO PER LA RICERCA DI SARS-CoV2" e di essere stato/a informato/a in modo comprensibile ed esauriente dall'operatore sanitario rispetto al test a cui sarò sottoposto.

Dichiaro in particolare, che mi sono stati chiariti i vantaggi e limiti che possono derivare dal test.

Recepita l'informazione ricevuta

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

all'esecuzione del Test.

Dichiaro, inoltre, di assumere i seguenti farmaci:

.....
.....

Data: ____/____/_____ Firma dell'Utente _____

DICHIARAZIONE DELL'OPERATORE SANITARIO

Io sottoscritto _____ confermo e attesto, in modo contestuale alla sottoscrizione della persona consenziente, che la stessa, a mio avviso, ha interamente compreso tutto quanto sopra esposto, punto per punto.

Data ____/____/_____ L'Operatore Sanitario _____

REVOCA DEL CONSENSO

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il ____/____/_____ **REVOCO** il
consenso all'effettuazione dell'atto sanitario su indicato

Data: ____/____/_____ Firma dell'Utente _____

Firma dell'Operatore Sanitario _____



INFORMATIVA TAMPONE ANTIGENICO **PER LA RICERCA DI SARS-CoV2**

CHE COS'È SARS-CoV2 E SINTOMATOLOGIA SARS-CoV2 è un virus appartenente alla famiglia dei Coronavirus, responsabile, in talune circostanze, della Sindrome Acuta severa delle vie respiratorie (Sars). L'infezione da questo virus può comportare un'iniziale risposta immunitaria dell'ospite senza sviluppo di alcuna malattia (i soggetti risultano asintomatici, come accade nella grande maggioranza dei casi), oppure una reazione minima con sintomi quali pseudo raffreddore, mal di gola, perdita della capacità di percepire odori, o in taluni casi, con sintomi di interessamento del tratto intestinale (diarrea, nausea). In una piccola percentuale di casi (i dati epidemiologici sono ancora in aggiornamento), l'infezione evolve in malattia più importante delle vie respiratorie più basse con sintomatologia quale tosse secca, respiro corto, senso di debolezza e sintomi pseudo influenzali come dolori muscolari, possibile espressione di una polmonite interstiziale. L'evoluzione della semplice infezione o della malattia (nelle sue diverse forme) dipende dalla dose infettante del virus e dalla "forza" del sistema immunitario dell'ospite (il soggetto infettato).

CHE COS'È IL TAMPONE ANTIGENICO Il tampone antigenico permette di rilevare le proteine virali del virus SARS-CoV2 (antigeni). La presenza di tali proteine nell'organismo è utile ad identificare la presenza del virus nella sua fase iniziale di infezione, ovvero nella fase pre-sintomatica (1-3 giorni prima di manifestarsi dei sintomi) o nella fase precoce dell'infezione (5-7 giorni dalla comparsa dei sintomi).

COME SI ESEGUE IL TEST Le modalità di raccolta sono del tutto analoghe a quelle del test molecolare (tampone nasofaringeo) e consistono nell'utilizzo di un sottile tampone che viene inserito nel naso per il prelievo del muco che potrebbe contenere il virus.

IL RISULTATO DOPO QUANTO SI OTTIENE ED ESITO Il risultato è pronto entro 15/30 minuti dall'esecuzione, l'esito può essere:

- **Positivo** (presenza degli antigeni)
- **Negativo** (assenza di antigeni)
- **Non valido** (il test va ripetuto perché probabilmente la quantità di muco prelevato era troppo scarso)

Il risultato negativo suggerisce che l'organismo potrebbe non essere stato esposto al virus fino ad oggi, ma rimane suscettibile di infezione se entra a contatto con il virus a partire dal momento del Test. Non è possibile inoltre escludere una bassa carica virale, a causa della quale il metodo utilizzato dal Test potrebbe non riuscire ad identificare la presenza del virus (sensibilità 99,4%). Pertanto un risultato negativo non esclude l'infezione da SARS-CoV2. Si consiglia al paziente di rivolgersi al proprio medico curante.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL TEST ALLE AUTORITÀ SANITARIE COMPETENTI Gli esiti dei test antigenici rapidi devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento.

CONSEGUENZE In base al protocollo n. 0000980/P del 14/01/2021 della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità il Caso sospetto sintomatico e Contatto asintomatico con esposizione ad alto rischio (contatto stretto) oppure attività di screening di comunità per motivi di sanità pubblica (ambito scolastico, luoghi di lavoro, RSA, etc.) in caso di POSITIVITA' al test rapido antigenico il caso si considera "CONFERMATO" senza necessità di test molecolare e i provvedimenti di isolamento possono essere attuati immediatamente; in caso di eventuale risultato NEGATIVO il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR o con secondo tampone antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni. In caso di screening periodico (comunità, luoghi di lavoro, etc.) non è necessaria la ripetizione del tampone antigenico a distanza e la frequenza di ripetizione del test deve essere valutata dal medico competente o dal medico responsabile dello screening e commisurata al rischio infettivo, alla circolazione del virus e al possibile impatto di un focolaio. Il Soggetto asintomatico, non appartenente a categorie a rischio che effettua il test su base volontaria o esame richiesto per motivi di viaggio (fatte salve specifiche prescrizioni dei paesi di destinazione che possano prevedere specificatamente test molecolare) il saggio antigenico risulta NEGATIVO non necessita di ulteriori approfondimenti, se POSITIVO va confermato con test di terza generazione o test in biologia molecolare.

